

# БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ



## СОСТАВ

Наполнитель мальтодекстрин – 0,4860 г, фермент лактаза – 0,0585 г, скользящее вещество магния стеарат – 0,0055 г; желатин, краситель титана диоксид (капсула твердая желатиновая).

**1 капсула содержит не менее 3450 единиц фермента лактазы.**

Пищевая и энергетическая ценность 1 капсулы: белков 0,1 г, жиров 0 г, углеводов 0,5 г; 2,5 ккал/10,0 кДж.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАД ЛАКТАЗАР® для взрослых и детей старше 7 лет

является дополнительным источником фермента лактазы, недостаток которого обычно проявляется: **дискомфортом в кишечнике, повышенным газообразованием, неустойчивым стулом.** Возникновение недостатка фермента возможно при хронических заболеваниях кишечника, при диарее, в том числе инфекционной природы, и в период последующего восстановления.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Взрослым и детям старше 7 лет** по 1 капсуле при приеме молока или пищи, содержащей молоко, молочные продукты

или углеводов лактозу.

Капсулу можно принять внутрь, можно вскрыть капсулу и добавить ее содержимое в еду или в молоко.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фермент лактаза расщепляет и обеспечивает всасывание углеводов и дисахарида лактозы, поступающего с пищей. Активность лактазы начинает снижаться в конце первого года жизни, причем наибольшей интенсивности этот процесс достигает в течение первых 3–5 лет жизни. Данные статистики свидетельствуют, что в среднем у 20 % взрослого населения России имеется недостаток лактазы, при этом у представителей отдельных народов распространенность недостатка этого фермента может превышать 80 %.

В случае дефицита лактазы при употреблении пищевых продуктов, содержащих лактозу, развиваются признаки нарушения пищеварения: дискомфорт в кишечнике, повышенное газообразование, нарушение стула. Дефицит лактазы может быть врожденным (первичная лактазная недостаточность) или приобретенным (вторичная лактазная недостаточность). Приобретенный дефицит лактазы возникает на фоне инфекционных и вирусных заболеваний кишечника, иммунных (пищевой аллергии, атопического дерматита),

воспалительных или атрофических изменений в кишечнике, дисбактериоза, паразитарных инвазий.

Дополнительный прием фермента лактазы позволяет устранить вздутие живота, чувство дискомфорта в кишечнике и нормализовать стул в случае дефицита собственного фермента в кишечнике при потреблении лактозосодержащих пищевых продуктов. К последним относятся: молоко, разнообразные продукты переработки молока (кисломолочные продукты, йогурты, творог, десерты, мороженое, сыры, масло сливочное), а также продукты, при изготовлении которых добавляется молоко или лактоза (колбасные изделия, каши, картофельное пюре, пудинги, нуга, пахта и др.).

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов.

**Перед применением следует проконсультироваться с врачом.**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Не является лекарственным средством.

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

## ФОРМА ВЫПУСКА

капсулы по 550 мг.  
По 5 или 10 капсул в контурной ячейковой



открыть капсулу



можно высыпать в молоко



можно добавить в пищу



можно проглотить во время еды

упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или по 50 или 100 капсул в банке полимерной, укупоренной крышкой.

1, 2, 3, 4, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок или 1 банка вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

## СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ:

№ RU.77.99.11.003.E.004623.10.17  
от 31.10.2017 г.

TU 10.89.19-004-00155547-17

## ПРОИЗВЕДЕНО по заказу

АО "Отсифарм", [www.otcpharm.ru](http://www.otcpharm.ru)



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",  
305022, Россия, г. Курск,  
ул. 2-я Аргентная, 1а/18,  
тел./факс: (4712) 34-03-13,  
[www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

