

Листок-вкладыш – информация для пациента

Максиколд Рино, 325 мг + 10 мг + 20 мг + 50 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом апельсина

Максиколд Рино, 325 мг + 10 мг + 20 мг + 50 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона

Максиколд Рино, 325 мг + 10 мг + 20 мг + 50 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины

Действующие вещества: парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + [аскорбиновая кислота]

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 3 дня, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Максиколд Рино, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Максиколд Рино.
3. Прием препарата Максиколд Рино.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Максиколд Рино.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Максиколд Рино, и для чего его применяют

Препарат Максиколд Рино – комбинированный препарат, в состав которого входят парацетамол, фенилэфрин, фенирамин и аскорбиновая кислота. Действующие вещества оказывают жаропонижающее, слабое противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, противоаллергическое, сосудосуживающее действие, в том числе сужая сосуды носа, устраняя отек слизистой оболочки полости носа и носоглотки, устраняют симптомы «простуды».

Показания к применению

Препарат Максиколд Рино применяется для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний (острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе гриппа), сопровождающихся высокой температурой, ознобом, ломотой в теле, головной

и мышечной болью, насморком, заложенностью носа, чиханием, у взрослых и детей 12 лет и старше.

Способ действия препарата Максиколд Рино

- Парацетамол оказывает обезболивающий и жаропонижающий эффект путем подавления производства физиологически активных веществ простагландинов в центральной нервной системе. После приема препарата внутрь максимальная концентрация парацетамола в плазме достигается через 10-60 минут.
- Фенилэфрин оказывает умеренное сосудосуживающее действие, уменьшает отек и покраснение (гиперемию) слизистой оболочки полости носа и носоглотки за счет стимуляции особых белков (альфа₁-адренорецепторов).
- Фенирамин блокирует специальные белки (H₁-гистаминовые рецепторы), устраняет аллергические симптомы, в умеренной степени оказывает седативный эффект и блокирует активность мускаринового ацетилхолинового рецептора – белка, участвующего в передаче сигналов через определенные части нервной системы.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Максиколд Рино

Противопоказания

Не принимайте препарат Максиколд Рино:

- если у Вас аллергия на парацетамол, фенилэфрин, фенирамин, аскорбиновую кислоту или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы принимаете трициклические антидепрессанты, бета-адреноблокаторы или другие симпатомиметические препараты;
- если Вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) или принимали их в течение последних 2-х недель;
- если у Вас повышенное давление в воротной вене (портальная гипертензия);
- если Вы страдаете алкоголизмом;
- если у Вас сахарный диабет;
- если у Вас гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз);
- если Вы беременны или кормите ребенка грудью;
- у детей в возрасте до 12 лет;
- если у Вас тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
- если у Вас повышено артериальное давление (артериальная гипертензия);
- если у Вас повышено внутриглазное давление (закрытоугольная глаукома);
- если у Вас опухоль надпочечника (феохромоцитома).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Максиколд Рино проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Это особенно важно, если:

- у Вас сердечно-сосудистые заболевания (в том числе хроническое заболевание, при котором образуются холестериновые бляшки в сосудах сердца (выраженный атеросклероз коронарных артерий));
- у Вас воспаление печени (острый гепатит);
- у Вас усиленное разрушение эритроцитов крови (гемолитическая анемия);
- у Вас бронхиальная астма;
- у Вас тяжелые заболевания печени или почек (сопутствующее заболевание печени повышает риск связанных с парацетамолом повреждений печени);
- у Вас доброкачественное увеличение размеров предстательной железы (гиперплазия и гипертрофия предстательной железы);
- у Вас затруднение мочеиспускания вследствие гипертрофии предстательной железы;
- у Вас заболевание крови;
- у Вас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- у Вас врожденное повышенное содержание билирубина в крови (врожденная гипербилирубинемия): синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора;
- у Вас заболевания вследствие спазма сосудов и нарушения тока крови по ним (вазоспастические заболевания), например, болезнь Рейно;
- у Вас истощение, обезвоживание;
- у Вас сужение начального отдела двенадцатиперстной кишки или пилорической области желудка (пилородуоденальная обструкция);
- у Вас сужающая просвет (стенозирующая) язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки;
- у Вас эпилепсия;
- Вы одновременно принимаете препараты, способные отрицательно влиять на печень (например, индукторы микросомальных ферментов печени);
- Вы одновременно принимаете другие препараты, снижающие артериальное давление (гипотензивные средства), дигоксин и другие сердечные гликозиды, алкалоиды спорыньи (эрготамин и метисергид);
- у Вас повторяющееся (рецидивное) образование уратных камней в почках;
- Вы пожилого возраста, так как Вы более подвержены развитию нежелательных эффектов.

Следует избегать приема препарата пациентами пожилого возраста со спутанностью сознания.

Одновременный прием с другими препаратами, содержащими парацетамол, может привести к передозировке. Передозировка парацетамола может вызвать развитие печеночной недостаточности, которая может привести к необходимости трансплантации печени или смертельному исходу.

Случаи нарушения функции печени/печеночной недостаточности были отмечены у пациентов с пониженным уровнем внутриклеточного белка глутатиона, например, у крайне истощенных пациентов, страдающих анорексией, с низким индексом массы тела, у пациентов с тяжелой хронической алкогольной зависимостью или сепсисом. При состояниях, сопровождающихся снижением уровня глутатиона, прием парацетамола может увеличивать риск возникновения расстройства кислотно-щелочного равновесия организма (метаболического ацидоза).

Не принимайте препарат Максиколд Рино одновременно с другими противоотечными (деконгестантами) и противоаллергическими (антигистаминными) препаратами.

Вам следует обратиться к врачу, если:

- у Вас бронхиальная астма, эмфизема или хронический бронхит;
- симптомы не проходят в течение 3 дней или сопровождаются тяжелой лихорадкой, продолжающейся в течение 3 дней, сыпью или постоянной головной болью;

Это могут быть признаки более серьезных нарушений.

Не принимайте препарат из поврежденного пакетика.

Фенилэфрин может способствовать ложному положительному результату допинг-контроля спортсменов.

Дети и подростки

Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет (см. раздел 2. «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат Максиколд Рино

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Некоторые препараты могут повлиять на эффективность лечения препаратом Максиколд Рино, а также препарат Максиколд Рино может изменить эффективность других препаратов. При этом может повышаться риск или степень тяжести нежелательных реакций.

Парацетамол:

- усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных средств, этанола (алкоголя);
- повышает риск повреждения печени (гепатотоксического действия) при одновременном приеме с барбитуратами, фенитоином, фенобарбиталом, карбамазепином, рифампицином, изониазидом, зидовудином и другими индукторами микросомальных ферментов печени;
- свойства варфарина, как препарата для уменьшения вязкости крови (антикоагулянта), и других кумаринов могут быть усилены на фоне длительного регулярного приема парацетамола, повышая риск кровотечений. Единичный прием парацетамола не оказывает такого эффекта;
- при одновременном приеме с метоклопрамидом скорость всасывания парацетамола увеличивается и, соответственно, быстрее достигается его максимальная концентрация в плазме. Аналогичным образом домперидон может увеличивать скорость всасывания парацетамола;
- при одновременном приеме с хлорамфениколом период полувыведения хлорамфеникола может увеличиться;
- может снизить усвоение препарата организмом (биодоступность) ламотриджина с возможным снижением его действия по причине увеличения скорости (индуцирования) его печеночного метаболизма;
- всасывание парацетамола может быть снижено при одновременном приеме с колестирамином, однако Вы можете этого избежать, если примете колестирамин на час позже парацетамола;
- регулярный прием парацетамола одновременно с зидовудином может вызвать снижение количества нейтрофилов в крови (нейтропению) и увеличить риск повреждения печени;

- пробенецид влияет на метаболизм парацетамола. Если Вы принимаете одновременно пробенецид, дозу парацетамола следует уменьшить;
- парацетамол может влиять на результаты теста по определению мочевой кислоты с использованием преципитирующего реагента фосфовольфрамата.

Фенилэфрин:

- может усиливать действие ингибиторов МАО и вызывать тяжелое заболевание, вызванное чрезмерным повышением артериального давления (гипертонический криз) у пациентов, которые принимают или принимали ингибиторы МАО в течение последних 2 недель. Прием препарата Максиколд Рино противопоказан у таких пациентов (см. раздел 2, подраздел «Противопоказания»);
- одновременный прием с другими симпатомиметическими препаратами или трициклическими антидепрессантами (например, амитриптилином) может увеличить риск сердечно-сосудистых побочных эффектов;
- может снижать эффективность бета-адреноблокаторов и других препаратов для снижения давления (например, дебризохина, гуанетидина, резерпина, метилдопы). Риск повышения артериального давления и других сердечно-сосудистых побочных эффектов может быть увеличен;
- одновременный прием фенилэфрина с дигоксином и другими сердечными гликозидами может увеличить риск развития аритмии или инфаркта миокарда;
- одновременный прием фенилэфрина с алкалоидами спорыньи (эрготамином и метисергидом) может увеличить риск отравления алкалоидами спорыньи (эрготизма).

Фенирамин:

- может усиливать влияние других веществ на центральную нервную систему (например, ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов, алкоголя, противопаркинсонических препаратов, барбитуратов, бензодиазепинов, транквилизаторов и наркотических средств);
- может снижать действие антикоагулянтов;
- обладает антихолинергической активностью и может усиливать антихолинергические эффекты других препаратов (например, других антигистаминных средств, препаратов для лечения болезни Паркинсона и фенотиазиновых нейролептиков).

Аскорбиновая кислота:

- повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина и железа;
- снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов;
- увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия;
- замедляет выведение почками кислот;
- увеличивает выведение лекарственных средств, имеющих щелочную реакцию (в т.ч. алкалоидов);
- снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов;
- ацетилсалициловая кислота (АСК), пероральные контрацептивы, свежие соки и щелочное питье снижают всасывание и усвоение. При одновременном применении с АСК повышается выведение с мочой аскорбиновой кислоты и снижается экскреция АСК. АСК снижает абсорбцию аскорбиновой кислоты примерно на 30 %;

- увеличивает токсичность железа, поэтому не следует применять препарат в первый месяц лечения дефероксамином;
- большие дозы аскорбиновой кислоты могут приводить к увеличению концентрации этинилэстрадиола в плазме крови у женщин, принимающих пероральные контрацептивы;
- одновременный прием аскорбиновой кислоты и флуфеназина может приводить к уменьшению концентрации флуфеназина в плазме крови;
- повышает общий клиренс этанола, который, в свою очередь, снижает концентрацию аскорбиновой кислоты в организме;
- лекарственные средства хинолинового ряда (фторхинолоны и др.), кальция хлорид, салицилаты, глюкокортикостероиды при длительном применении истощают запасы аскорбиновой кислоты;
- при одновременном применении уменьшает хронотропное действие изопrenalина;
- при длительном применении или применении в высоких дозах может нарушать взаимодействие дисульфирама и этанола;
- в высоких дозах повышает почечную экскрецию мексилетина;
- барбитураты и примидон повышают выведение аскорбиновой кислоты с мочой;
- уменьшает терапевтическое действие антипсихотических лекарственных средств (производных фенотиазина), канальцевую реабсорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов.

Препарат Максиколд Рино с алкоголем

Повреждение печени (гепатотоксичность) парацетамолом может усиливаться при хроническом или чрезмерном потреблении алкоголя. Во избежание этого не принимайте препарат одновременно с алкогольными напитками.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не принимайте препарат Максиколд Рино при беременности и в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Максиколд Рино может вызывать сонливость, поэтому во время лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с механизмами. У некоторых пациентов фенирамин (одно из действующих веществ препарата) может вызывать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивной функции и координации движений, что может значительно повлиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Эти нежелательные реакции могут дополнительно усиливаться при приеме алкогольных напитков или других седативных препаратов.

Препарат Максиколд Рино содержит сахарозу, натрий и краситель азорубин (кармуазин (E 122))

Сахароза

1 пакетик препарата содержит 13,6 г сахарозы, что необходимо учитывать, если у Вас сахарный диабет. Если лечащий врач сообщил, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

Натрий

Данный лекарственный препарат содержит 32,8 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в каждом пакете. Это эквивалентно 2% от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

Краситель азорубин (Максиколд Рино с ароматом малины)

Препарат содержит краситель азорубин, который может вызывать аллергические реакции и оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

3. Прием препарата Максиколд Рино

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

По одному пакету каждые 4-6 часов (не более 3-4 доз (пакетов) в течение 24 часов).

Препарат Максиколд Рино можно принимать в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном, на ночь.

Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

Не превышайте указанную дозу.

Особые группы пациентов

Пациенты с почечной недостаточностью

При наличии у Вас почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) между приемами препарата Максиколд Рино должен быть не менее 8 часов.

Пациенты с печеночной недостаточностью

Если у Вас нарушена функция печени или синдром Жильбера, Вам необходимо уменьшить дозу или увеличить интервал между приемами препарата Максиколд Рино.

Лица пожилого возраста

Нет необходимости в корректировке дозы.

Применение у детей и подростков

Режим дозирования у детей в возрасте 12 лет и старше совпадает с режимом дозирования у взрослых.

Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Содержимое одного пакета растворите в стакане (250 мл) кипяченой горячей воды и выпить горячим. Можно добавить сахар по вкусу.

Продолжительность терапии

Принимайте наименьшую дозу, необходимую для достижения эффекта, в течение максимально короткого срока лечения.

Если не наблюдается облегчение симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, Вам необходимо обратиться к врачу. Не принимайте препарат Максиколд Рино более 5 дней.

Если вы приняли препарата Максиколд Рино больше, чем следовало

Симптомы, обусловленные парацетамолом (проявляются после приема свыше 10-15 г)

Выраженность передозировки парацетамола зависит от дозы, поэтому нельзя одновременно с препаратом Максиколд Рино принимать другие парацетамолсодержащие препараты.

Риск передозировки выражен особенно у пожилых пациентов, у детей, у пациентов с заболеваниями печени, в случаях хронического алкоголизма, у пациентов, страдающих истощением, и у пациентов, принимающих индукторы микросомальных ферментов печени. Передозировка парацетамола может привести к печеночной недостаточности, нарушению функции головного мозга (энцефалопатии), трансплантации печени, коме и смерти.

Симптомы передозировки парацетамола в первые 24 часа: бледность кожных покровов, тошнота, рвота, нарушение пищевого поведения (анорексия), судороги. Боль в животе может быть первым признаком поражения печени и обычно не проявляется в течение 24-48 часов и иногда может проявиться позже, через 4-6 дней. Повреждение печени проявляется в максимальной степени в среднем по истечении 72-96 часов после приема препарата. Также может появиться нарушение процесса усвоения глюкозы и метаболический ацидоз. Даже при отсутствии поражения печени может развиваться острая почечная недостаточность и разрушение специфических клеток почки (острый тубулярный некроз). Сообщалось о случаях сердечной аритмии и развития острого панкреатита, обычно с нарушением функции печени и токсическим воздействием на печень.

Лечение

В случае передозировки Вам требуется незамедлительно обратиться к врачу, даже при отсутствии симптомов передозировки.

Симптомы, обусловленные фенилэфрином и фенирамином (симптомы передозировки для фенирамина и фенилэфрина объединены из-за риска взаимного усиления парасимпатолитического эффекта фенирамина и симпатомиметического эффекта фенилэфрина в случае передозировки препарата)

Сонливость, к которой в дальнейшем присоединяется беспокойство (особенно у детей), зрительные нарушения, раздражительность, сыпь, тошнота, рвота, головная боль, повышенная возбудимость, головокружение, бессонница, нарушение кровообращения, кома, судороги, изменение поведения, нарушение сознания, галлюцинации, повышение или снижение артериального давления, аритмия и брадикардия. При передозировке фенирамина сообщалось о случаях атропиноподобного «психоза».

Лечение

В случае появления симптомов передозировки необходимо обратиться к врачу для проведения соответствующего лечения.

Аскорбиновая кислота

Высокие дозы аскорбиновой кислоты (более 3000 мг) могут вызывать временную осмотическую диарею и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошноту и дискомфорт в животе.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Максиколд Рино может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Максиколд Рино и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции, которая наблюдалась редко (может возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- аллергическая реакция немедленного типа (анафилактическая реакция), резко начинающийся ограниченный отек кожи или слизистых оболочек (ангионевротический отек).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Максиколд Рино.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сонливость;
- тошнота, рвота.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- гиперчувствительность, кожная аллергическая реакция (крапивница), аллергический дерматит;
- повышенная возбудимость, нарушение сна;
- головокружение, головная боль;
- закрытоугольная глаукома, расширение зрачка (мидриаз), повышение внутриглазного давления;
- частое сердцебиение (тахикардия), ощущение сердцебиения;
- повышение артериального давления;
- сухость во рту, запор, боль в животе, диарея;
- повышение активности печеночных ферментов;
- сыпь, кожное заболевание (экзема), красные высыпания на коже (пурпура), зуд, ограниченное интенсивное покраснение кожи (эритема);
- затруднение мочеиспускания;
- недомогание.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- сниженное количество тромбоцитов в крови (тромбоцитопения), уменьшение или отсутствие нейтрофилов в крови (агранулоцитоз), уменьшение количества красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов (панцитопения);
- реакции кожной гиперчувствительности, включающие, помимо прочего, тяжелые кожные реакции (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона) и кожную сыпь;
- бронхоспазм у пациентов, чувствительных к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП);
- нарушение функции печени.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- снижение лейкоцитов в крови (лейкопения), усиленное разрушение эритроцитов крови (гемолитическая анемия);
- галлюцинации, спутанность сознания;
- антихолинергические симптомы (задержка мочи, сухость слизистых оболочек, замедление моторики кишечника и др.), нарушение координации движений, тремор, потеря памяти или концентрации внимания, нарушение равновесия, седация;

- изменение оптической установки глаза к любому расстоянию (парез аккомодации);
- резкое снижение артериального давления при переходе положения тела из горизонтального в вертикальное (ортостатическая гипотензия);
- сухость слизистой оболочки.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Армения

«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ГНКО

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5

Телефон: + 374 60 83 00 73

Электронная почта: info@ampra.am, vigilance@pharm.am

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.pharm.am/>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:

220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: www.rceth.by

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
Здравоохранения Кыргызской Республики

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Телефон: +996 312 21-92-88, 0800 800 26 26

Факс: +996 312 21-05-08

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://dlsmi.kg/ru>

5. Хранение препарата Максиколд Рино

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после обозначения «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (термосвариваемый пакет) для защиты от света.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Максиколд Рино содержит

Действующими веществами являются парацетамол, фенилэфрин, фенирамин и аскорбиновая кислота.

Каждый пакет препарата содержит 325 мг парацетамола, 10 мг фенилэфрина гидрохлорида, 20 мг фенирамина малеата, 50 мг аскорбиновой кислоты.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются:

порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом апельсина:

лимонная кислота (лимонная кислота безводная), яблочная кислота, сахароза (сахар) (сахар белый), титана диоксид (Е 171), натрия цитрат (натрия цитрат безводный), ароматизатор апельсиновый, краситель хинолиновый желтый, кальция фосфат (трикальция фосфат), этилцеллюлоза;

порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона:

лимонная кислота (лимонная кислота безводная), яблочная кислота, сахароза (сахар) (сахар белый), титана диоксид (Е 171), натрия цитрат (натрия цитрат безводный), ароматизатор лимонный, краситель хинолиновый желтый, кальция фосфат (трикальция фосфат), этилцеллюлоза;

порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины:

лимонная кислота (лимонная кислота безводная), яблочная кислота, сахароза (сахар) (сахар белый), титана диоксид (Е 171), натрия цитрат (натрия цитрат безводный), ароматизатор малиновый, краситель хинолиновый желтый, краситель азорубин (кислотный красный 2С) (Е 122), кальция фосфат (трикальция фосфат), этилцеллюлоза.

Препарат Максиколд Рино содержит сахарозу, натрий и краситель азорубин (кармуазин (Е 122)) (с ароматом малины) (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Максиколд Рино и содержимое упаковки

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом апельсина:

гранулированный порошок желтого цвета с характерным запахом. Допускается наличие кристаллов и гранул белого цвета и легко рассыпающихся комков. Порошок растворяется в 250 мл горячей воды с образованием опалесцирующего раствора светло-желтого цвета с характерным запахом апельсина.

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом лимона:

гранулированный порошок желтого цвета с характерным запахом. Допускается наличие кристаллов и гранул белого цвета и легко рассыпающихся комков. Порошок растворяется в 250 мл горячей воды с образованием опалесцирующего раствора светло-желтого цвета с характерным запахом лимона.

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь с ароматом малины:

гранулированный порошок от светло-розового до темно-розового с красноватым оттенком цвета с характерным запахом. Допускается наличие кристаллов и гранул белого цвета и легко рассыпающихся комков. Порошок растворяется в 250 мл горячей воды с образованием опалесцирующего раствора розового цвета с характерным запахом малины.

По 15,0 г препарата в термосвариваемом пакете из материала комбинированного.

5 или 10 пакетов вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм")

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 10, помещ. 1/16

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

Электронная почта: info@otcpharm.ru

Производитель

Российская Федерация

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")

Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Различные торговые наименования

Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Республика

Максиколд® Рино

Республика Армения

Максиколд® Рино-Отисифарм

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика

Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм")

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 10, помещ. 1/16

Телефон: +7 (800) 775-98-19

Адрес электронной почты: info@otcpharm.ru

Прочие источники информации

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.07.2026 № 14482
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш доступен на всех языках государств-членов Евразийского экономического союза в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) <https://grls.rosminzdrav.ru/> (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).