

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ»

БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ – это не лекарство, а дополнительный источник фермента лактазы для лучшего усвоения дисахарида лактозы из грудного молока или молочной смеси. Лактаза способствует улучшению процессов пищеварения при состоянии лактазной недостаточности.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИВОТИКЕ МАЛЫША?

Одной из частых причин колик у малышей может являться **лактазная недостаточность (ЛН)** - недостаток собственного фермента лактазы в кишечнике. **Лактаза** – это пищеварительный фермент, необходимый для расщепления и усвоения **лактозы** – молочного сахара, который содержится в грудном молоке, молочных смесях и является источником энергии, обеспечивает нормальное развитие нервной системы и зрительного аппарата ребёнка.

Лактазная недостаточность может быть **временной, врожденной** (генетически обусловленной), **вторичной** (возникает на фоне инфекционных, иммунных или воспалительных изменений в кишечнике, в том числе у детей с признаками пищевой аллергии, атопическим дерматитом, страдающих дисбактериозом, паразитарными инвазиями).
Временная (транзиторная) ЛН чаще встречается у новорожденных с «незрелой» пищеварительной системой, у недоношенных или маловесных детей. Обычно возникает в возрасте 3 недель и проходит к 4-6 месяцам по мере созревания собственной пищеварительной системы малыша.

Не расщепленная полностью лактоза поступает в кишечник, приводит к процессам брожения, вызывая:

- кишечные колики;
- повышенное газообразование и вздутие живота;
- нарушение стула: запор или часто жидкий стул;
- плач и беспокойство младенца после кормления.

Прием фермента лактазы позволяет сохранить грудное вскармливание и способствует улучшению процессов пищеварения в случае недостатка выработки собственного фермента в кишечнике. Действует на лактозу в составе молока или смеси, помогая её усвоить.

По данным клинического исследования* среди детей, находящихся на грудном вскармливании, в возрасте от 2 недель до 3 месяцев жизни с проявлениями лактазной недостаточности применение по 700 ЕД лактазы в каждое кормление:

- ✔ Приводило к устранению колик, вздутия, диареи, начиная с 3-го дня регулярного приёма;
- ✔ Характеризовалось хорошей переносимостью и эффективностью в устранении функциональных нарушений пищеварения у детей с лактазной недостаточностью.

СОСТАВ:

Носитель мальтодекстрин, фермент лактаза, среднецепочечные триглицериды; капсула: желатин, красители: диоксид титана, желтый хинолиновый.

1 капсула содержит не менее 700 единиц фермента лактазы.

Твердая желатиновая капсула содержит краситель желтый хинолиновый, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Для приема внутрь предназначено только содержимое капсулы, не содержащее этого красителя.

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 1 КАПСУЛЫ:

Белков 0,01 г, жиров 0,0 г, углеводов 0,1 г; 0,43 ккал/ 1,8 кДж.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, источника фермента лактазы при лактазной недостаточности.

БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ является дополнительным источником фермента лактазы, помогает восполнить его дефицит. Лактаза способствует лучшему усвоению лактозы и улучшению процессов пищеварения при лактазной недостаточности у ребенка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ применяется при лактазной недостаточности из расчета 1 капсула на 100 мл молока или молочной смеси. Разведение содержимого капсулы в воде не предусматривается.

В среднем в 100 мл грудного молока содержится 5-7 г лактозы. Расчетное количество фермента для расщепления такого количества молочного сахара - около 700 ЕД лактазы (1 капсула)

БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Количественное содержание лактозы в молочных продуктах различается в зависимости от вида продукта, в грудном молоке – от стадии лактации, при этом степень дефицита фермента лактазы в кишечнике у каждого ребёнка индивидуальна.

Для наиболее точного подбора дозировки необходима консультация специалиста!

Дети до 1 года на грудном и смешанном вскармливании:



Перед кормлением сцедить 5-10 мл грудного молока.



Высыпать в молоко содержимое капсулы, перемешать в течение 2-3 минут.



Начать кормление с этой порции, затем докормить из груди.

Дети до 1 года на искусственном вскармливании:



Содержимое капсулы добавить непосредственно в теплую (до +37°С) готовую молочную смесь.



Тщательно перемешать, через несколько минут приступить к кормлению.

Дети от 1 года до 5 лет:



Содержимое капсулы добавить в теплое (до +37°С) молоко или подогретую пищу (до +37°С), содержащую молоко.



Тщательно перемешать и через несколько минут приступить к кормлению.

Дети от 5 до 7 лет:



Содержимое капсулы добавить в теплое (до +37°С) молоко или подогретую пищу (до +37°С), содержащую молоко.



Тщательно перемешать и через несколько минут приступить к приему пищи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА:

Продолжительность приема определяется индивидуально по рекомендациям врача.

БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ следует давать малышу **в каждое молочное кормление, не пропуская приём,** так как лактоза содержится в каждой порции молока/молочной смеси, а её брожение в кишечнике приводит к повышенному газообразованию, является причиной вздутия и младенческих колик.

Фермент лактаза применяется, пока не завершится созревание собственной ферментной системы кишечника ребёнка. Процесс созревания является индивидуальным для каждого малыша и может продлиться **до 4 и более месяцев** от рождения.

При возникновении любых сомнений при применении рекомендуется проконсультироваться с наблюдающим врачом-педиатром.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Перед применением следует проконсультироваться с врачом-педиатром.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 25°С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Капсулы по 197 мг (масса содержимого капсулы 150 мг).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ:

АМ.01.48.01.003.R.000202.04.26 от 30.04.2026 г.
ТУ 10.89.19-002-47170086-2025

СРОК ГОДНОСТИ:

2 года с даты изготовления.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Акционерное общество «Отисифарм Про» (АО «Отисифарм Про»),
Российская Федерация, 238315, Калининградская область, муниципальный округ Зеленоградский,
тер. Индустриальный парк Храброво, ул. Новаторов, д. 6, к. 1
Телефон: +7 (800) 775-98-19
Адрес электронной почты: info@otcpharm.ru
www.laktazar.ru

PHARM PRO
ОТИСИФАРМ ПРО

22 PAP

Узнай больше про БАД ЛАКТАЗАР® ДЛЯ ДЕТЕЙ
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 18+

Лактазар®

* Абрамова Т.В., Конь И.Я. Терапия лактазной недостаточности у детей первых месяцев жизни. Лечащий врач, январь 2009, № 1, с.68-72.